

Identification DD(ETS)PP

FICHE DE SIGNALEMENT ET DE COMMÉMORATIFS

☐FCO/☐MHE

Uniquement en cas de suspicion clinique officielle
(présence de signes cliniques)

A renseigner et à transmettre sans délai à la DDPP et à joindre au(x) prélèvement(s) pour le laboratoire

VETERINAIRE :

Vétérinaire sanitaire de l'élevage ☐ oui ☐ non N° Ordre

Nom du vétérinaire : N° de téléphone

:

Adresse :

Nombre de kilomètres parcourus (aller-retour) : Puissance fiscale du véhicule :

ETABLISSEMENT :

Elevage identifié : ☐ oui ☐ non Si oui : N°EDE/NUMAGRIT :

Nom/ raison sociale :

Adresse :

..... N° de téléphone :

SUSPICION EN COURS :

Date de la visite :

Espèces présentes	Effectif total	Nombres animaux présentant signes cliniques	Nombre animaux morts	Date 1 ^{ers} symptômes
☐ bovins				
☐ ovins				
☐ caprins				
☐ autres :				
.....				

PRELEVEMENT(S) :

Date du prélèvement :

Laboratoire destinataire :

Animal (3 prélèvements maximum)				Prélèvement	
Identifiant animal	Espèce	Age	Vacciné	Type de prélèvement	N° prélèvement
			O / N	☐ Sang tube EDTA ☐ Rate	
			O / N	☐ Sang tube EDTA ☐ Rate	
			O / N	☐ Sang tube EDTA ☐ Rate	

En cas d'avortement ne pas prélever la mère. Prélever quelques grammes de la rate de l'avorton. Transmission de l'échantillon au laboratoire dans un contenant sec, stockage à + 4 °C.

COMMENTAIRE EVENTUEL :

SIGNATURE ET CACHET :

STATUT VACCINAL DE L'ELEVAGE :Elevage vacciné : ☐ oui ☐ non ☐ Inconnu

Nom(s) vaccin(s)	Date(s) primo-vaccination	Date de rappel



Pour valider une suspicion FCO ou MHE :
Il faut observer au moins 2 signes cliniques dont un doit être listé dans le tableau 1.

Tableau 1 : Signes cliniques principaux rencontrés chez les animaux adultes

Yeux	Mufle	Bouche /cavité buccale	Membres
☐ Conjonctivite /larmolement ☐ Yeux exorbités ☐ Œdème péri-oculaire	☐ Congestion ou pétéchies ☐ Erosions/ulcères/croûtes mufle ou muqueuse nasale ☐ Jetage nasal ☐ Œdème mufle	☐ Erosions/ulcères muqueuse buccale ☐ Ptyalisme ☐ Congestion lèvres ou muqueuse buccale ☐ Œdème intermandibulaire	☐ Raideur des membres ☐ Boiterie ☐ Œdème paturons, boulet, canon, carpe/jarret ☐ Œdème et/ou congestion bourrelets coronaires
Face	Langue	Mamelle/vulve	Peau (ovins)
☐ Œdème face	☐ Cyanose langue ☐ Œdème langue	☐ Erosions/ulcères/croûtes trayons, mamelle ☐ Erosions/ulcères vulve	☐ Perte de laine

Tableau 2 : Autres signes cliniques rencontrés chez les animaux adultes

Atteinte de l'état général	Mamelle
☐ Abattement, dépression ☐ Hyperthermie ☐ Chute de l'appétit, anorexie ☐ Prostration, incapacité à se lever	☐ Congestion trayons/mamelle
☐ Perte de poids / fonte musculaire ☐ Tachypnée, dyspnée, respiration bruyante ☐ Diminution de la production laitière	
Avortement	Autres/commentaires :
☐ Avortement /vêlage prématuré Nombre d'avortements (ou vêlage prématurés) depuis l'apparition des signes cliniques sur nombre de mise bas sur la même période :/.....	

Tableau 3 : Signes cliniques rencontrés chez les jeunes animaux : veaux sinon précisez :

☐ Cécité ☐ Chétifs, mort-nés, prématurés	☐ Signes cliniques nerveux, paralysie, opisthotonos, « veau mou » ☐ Autres :
---	---



Ne pas oublier de penser à la fièvre aphteuse et de contacter immédiatement la DD(ETS)PP si :

☐ Présence de vésicules remplies d'exsudat dans la cavité buccale (rare car fragiles et se rompent rapidement) ☐ Signes cliniques compatibles FCO/MHE mais observés entre janvier et avril ☐ Augmentation exponentielle du nombre de cas chez les bovins (nouveaux cas tous les jours)	☐ Mortalité chez les veaux, agneaux et/ou porcelets du même élevage ☐ Observation d'un « cœur marbré » chez des veaux, agneaux et/ou porcelets du même élevage ☐ Porcs présents sur l'élevage avec des signes évocateurs
---	---